DE GERANIO. CAP. LXXVI.

NOMINA.

C *Rostrũ ciconiæ. Geranium unde dictum.*

GEPANION græcè, Geranium latinè, uulgo & herbarijs Rostrum ciconiæ appellatur. Geranium autem à gruini capitis imagine, quæ summo eius plantæ capitulo ineſt, Græcis aptiſsima ſimilitudine dictum eſt. Sic recentioribus à ciconiæ roſtri effigie, Roſtrum ciconiæ nominatũ eſt.

GENERA.

Primum genus. Duo Geranij Dioſcorides tradit genera. Primum quod longioribus roſtris, & in mucronem acuminatis conſtat. Hoc hodie officinis & herbarijs Acus paſtoris & *Secundum.* Muſcata, Germanis uerò Storckenſchnabel dicitur. Alterum quod maluæ folia *Amomũ non eſt* habet, *Pes columbinus* uulgo nominatur. Sunt qui turpiter aberrantes, Amomũ *Pes columbinus.* eſſe exiſtimant. Germanicè Taubenfüß/oder Schartenkraut appellatur. Præter *Tertium.* hæc duo alia adiecimus genera, inter quæ id quod tertium ordine eſt, folijs Arte- *Robertiana.* miſiæ tenuifoliæ uel Chærephyllo ſimile exiſtit, herba Roberti & Robertiana à nonnullis, hauddubiè à ſuperſtitione aliqua Diui, qua ſuperior ætas mirificè im- *Quartum.* buta fuit, appellatur, germanicè Ruprechtskraut. Quartum folia obtinens la- *Quintum.* ciniata, germanicè pro certiori diſcrimine Kranichhalß uocari poteſt. Quintum, quod folia Ranunculi habet, gratia Dei nominatur, germanicè Gottes gnad / ab *Sextum.* inſigni in ſanandis uulneribus effectu. Sextum, quod forma quarto generi ſimillimum eſt, nec ferè ab illo niſi ſola magnitudine foliorũ, florum & radicis diſtat, germanicè Blůtwurtz / à rubro colore aut mirifica in ſiſtendo ſanguinis profluuio facultate uocatur.

FORMA.

Primi. Geranium primum caules habet à radice rubentes, lanuginoſos, folia Anemones, diuiſuris inciſa, flores purpureos, & in cacumine caulium faſtigia capitulis ci-
D coniçe aut gruũm cum roſtellis longitudine acus emicantia. Radicẽ oblongã & ſub-
Secundi. rotundã dulcemq;. Alterũ ut præcedẽs caules tenues, rubentes à radice ſtatim, lanuginoſosq; obtinet, folia maluæ ſimilia, candidiora, floſculos ſubpurpureos, capi-
Tertij. tella gruini capitis modo roſtrata, radicem tenuem & oblongam. Tertium, cau-
les habet à radice rubeſcentes, lanuginoſos, geniculatos, ſaporis & odoris iniucundi, folia Chærephyllo aut Artemiſiæ tenuifoliæ ſimilia, flores purpureos, capitel-
Quarti. la gruini capitis modo roſtrata, radicem intus uiridem, & adſtringentem. Quartum, cauliculos itidem ut reliqua rubentem, lanuginoſum, folia laciniata admodũ, flores purpureos, ex quibus capitella gruini capitis inſtar roſtrata, & in ijs ſemina
Quinti. quinq; naſcuntur: radicem intus candidam, extrà ſubluteam. Quintum reliqua omnia magnitudine excedit, caules emittit oblongos, rotundos, modicè lanugino-ſos, à radice ſtatim rubentes, folia Ranunculo ſimilia, flores ferè cæruleos, capitella præcedenti Geranio ſimilia, radicem craſſam & longam, multis exiguis radiculis ue-
Sexti. luti capillamentis quibuſdam fibratã. Sextum ramos habet tenues, lanuginoſos, folia laciniata, tenuia, flores in ſummo purpureos, ex quibus, ut in quarto, capitella gruini capitis formam referentia proueniunt. Radicem extrà & intus ruſam.

LOCVS.

Omnia Geranij genera in incultis proueniũt. Primum paſsim in campeſtribus, & nõnunquam inter ſegetes naſcitur. Alterum in colliculis. Tertium in umbroſis locis & dumetis. Quartum in agrorum limitibus, & iuxta ſepes. Quintũ in pratis. Sextum in locis montoſis & ſaxoſis.

TEMPVS.

Primũ ſtatim inter initia ueris Aprili menſe flores ſuos oſtendit, & ſubinde per integram æſtatem. Alterum, tertium, & quartum, Maio menſe florent. Quintum Iunio & Iulio menſibus, quemadmodum etiam ſextum.

TEMPERAMENTVM.

Omnium folia & radices, primo excepto, cuius radix dulcis eſt, quodammodo, atquea-

A atqueadeò diſcutiendi ui prædita, adſtringunt ac ſiccant

VIRES. EX DIOSCO

Radix Geranij primi in uino drachmæ pondere pota
Secundum nullum habet in medicina uſum.

EX PAVLO.

Geranium quod folijs reſpondet Anemones, radicem
uino drachmæ unius pondere ſumpta, uteri inflationes
ſpecies in re medica inutilis eſt.

EX PLINIO.

Primæ Geranij ſpeciei radix, reficientibus ſe ab imbec
contra phthiſin drachma in uini cyathis tribus bis die. Ite
& cruda idem præſtat. Succus radicis auribus medetur.
chmis quatuor cum pipere & myrrha potum.

APPENDIX.

Etſi ſecundum Geranij genus à Dioſcoride alijſq; nõn
medicina uſus damnatũ ſit, tamen poſterior ætas quotid
dis uulneribus & fiſtulis, eius ac reliquorum etiam miru
proinde eas herbas his ipſis in potu mirificè cõferre tradu
earundem uires olim fuiſſe ignoratas, cum & aliarum mu
tes, quas conſtat eſſe hodie notiſsimas, ueteribus fuiſſe in
ut demonſtrari debeat. Antiquus quoq; herbarius, præc
magnam uim obtinere in glutinandis uulneribus, & artic
dis tradit. Primi autem radicem mouendi urinam faculta
culoſis, ſtranguriæ & difficultati urinæ prodeſſe. Tertiur
B larum, pudendorumq; ulcera ſananda unicè cõducit. Rel
da ulcera mirificè proſunt. Nullum uerò ad ſanguinem u
peſcendũ præſtantius ſexto eſt: unde etiam Germani, ut
wurtz / hoc eſt, ſanguinariam radicem appellare uoluerun

DE GONGYLE. CAP.

NOMINA.



ΟΓΓΥΛΗ, Γογγυλὶς Græcis, Rapum Latini
Rúben appellatur. Græci autem à figura eiu
eſſe ſolet, uocabulum detorſerunt. Nanq; q
ctum eſt, uel in orbem circumagitur, γογγύ
quod ex terræ rure, quaſi ruapa, Varrone te

GENERA.

Rapi duo ſunt genera. Vnum ſatiuũ, quod ſimpliciter
Eſtq; id iterum duũm generum. Vnum candidum, quo
rúben uocant: & alterum rubrum, rot rúben ijdem appel
quod uulgus Rapunculum, quaſi paruũ rapum, Germa

FORMA.

Rapum ſatiuũ caule & folijs raphano ſimile eſt: floribu
bus ſemen profert, Napis aut Braſsicis. Syluestre frutex
moſum, in ſummo leue, folia nimirum leuia habens, digit
Semen in calyculatis fert ſiliquis: dehiſcentib. uerò ſeminũ
pitũ ſpecie eſt ſiliqua, in qua ſemina parua nigra ſunt, ſed
Flos eius in purpureũ uergit colorem. Radix digitalis fer
ſus alludit ad hanc herbam quam uulgus Rapunculum n
lis eſt, fruticoſa, ramoſa, folio digitali, nigro in ſiliquis ſem
album intus apparet. Flos etiam purpurei coloris eſt, radi
magnitudine conſtat.